

Biologická ochrana chovov hydiny

Vzhľadom na vzniknutú situáciu vo výskyte vtácej chrípky na území Slovenskej republiky, **Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta odporúča všetkým chovateľom prijať a dôsledne dodržiavať opatrenia na zvýšenie biologickej ochrany v chovoch hydiny.**

Biologická ochrana je súhrn krokov, ktoré zvyšujú hygienickú úroveň chovov a pomáha znižovať riziko výskytu a minimalizuje možnosť šírenia infekcie.

Dodržiavaním biologickej ochrany pomáhate ochraňovať hydinu a vtáky pred možnou infekciou,

Spôsoby šírenia ochorenia:

- pohyb hydiny, ľudí a dopravných prostriedkov medzi farmami
- nákup hydiny z nekontrolovaných chovov
- používanie nevydezinfikovaných pracovných nástrojov
- kontakt s hmyzom a divými vtákmi
- konzumácia a pitie kontaminovanej vody a krmiva
- nedostatočná dezinfekcia dopravných prostriedkov a iných technických prostriedkov

Kroky zabezpečujúce zvýšenie biologickej ochrany:

- zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov , zvlášť vodného vtáctva , s hydinou
- zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny
- zákaz chovu hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach
- zoznámiť zamestnancov s pohotovostnými plánmi a zvýšiť intenzitu zdravotných kontrol hydiny so zameraním na klinické príznaky aviárnej influenzy
- prísne dodržiavať nákup hydiny len zo schválených fariem so stálym veterinárnym dozorom
- novo nakúpenú hydinu umiestniť do sanovaných priestorov
- pre každú halu zabezpečiť vlastné pracovné nástroje a dezinfekciu pri vstupoch a výstupoch z priestorov
- pri zvýšení úhynu, znížení znášky a výskyte respiračných príznakov informovať veterinárneho lekára a príslušnú regionálnu veterinárnu správu
- minimalizovať počty ľudí prichádzajúci do styku s hydinou
- správne používanie osobných ochranných pomôcok
- hydina vo voľnom výbehu sa kŕmi a napája v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu
- hydina sa nenapája vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu
- vlastníci alebo držiteľia bezodkladne oznamujú príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtácej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
 - pokles v príjme potravy a vody o viac ako 20 %,
 - pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
 - týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtná zmena, ktoré svedčia pre vtáčiu chrípku

Žiadame Vás v prípade výskytu klinických príznakov vtácej chrípky (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) bezodkladne informovať **svojho súkromného veterinárneho lekára** a oznámiť to aj na RVPS Galanta, tel.: 031/780 2011, 031/780 2012.